

## FICHA TÉCNICA

### TURBO MIX ADVANCED

Fórmula líquida totalmente hidrosoluble y balanceada para proporcionar tres elementos menores indispensables para una agricultura eficiente: Zinc Boro y Calcio. Todos estos elementos están energizados con algas marinas naturales de fuente vegetal.

TURBO MIX ADVANCED, ha sido diseñado para corregir rápidamente deficiencias críticas de Calcio, Boro, Zinc en todo tipo de cultivo.

### ESPECIFICACIONES

| INGREDIENTE ACTIVO | CANTIDAD   |
|--------------------|------------|
| Calcio (CaO)       | 16.00% p/v |
| Boro (B)           | 0.60% p/v  |
| Zinc (Zn)          | 3.00% p/v  |
| Carbohidratos      | 27.00% p/v |
| Glicina Betaína    | 4,50% p/v  |
| Ácido algínico     | 4,30% p/v  |
| Molibdeno (Mo)     | 0,22% p/v  |

### BENEFICIOS

- Mejora la vida post cosecha de frutos.
- Fortalece la pared celular.
- Reduce fisiopatías (cracking)
- Acción frente a problemas de estrés hídrico, salino y térmico

### INCOMPATIBILIDAD

TURBO MIX ADVANCED, es altamente compatible con la mayoría de agroquímicos, sin embargo, es recomendable hacer una prueba de incompatibilidad antes de mezclarlo.

### RECOMENDACIONES DE USO

Su aplicación es ideal para todo tipo de cultivo, generalmente es recomendado utilizar en aplicaciones foliares con la ayuda de una bomba manual o a motor de espalda. Fertilizante foliar/edáfico rico en calcio, boro y zinc, equilibrado para todo tipo de cultivos en especial ornamentales, enriquecido con algas marinas. Corrige eficazmente sus deficiencias, la mal formación de las yemas y evita el cabeceo de la flor.

### CARACTERÍSTICAS

| PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS                                       |                                                                       |                                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| pH: 4.10                                                          |                                                                       | Forma: Líquido                                                        | Color: Oscuro                           |
| Densidad: 1.40                                                    |                                                                       | Corrosividad: No corrosivo.                                           |                                         |
| Conductividad eléctrica 3,22 S/m                                  |                                                                       | Inflamabilidad: No Inflamable.                                        |                                         |
| PROPIEDADES GENERALES                                             |                                                                       |                                                                       |                                         |
| <b>Almacenamiento:</b><br>Conservar en un lugar cerrado y fresco. | <b>Ambiental:</b><br>Producto no residual, de bajo impacto ambiental. | <b>Incompatibilidad:</b><br>No mezclar con agentes oxidantes fuertes. | <b>Toxicidad:</b><br>Ligeramente Tóxico |

### DOSIS

## CONSULTE CON UN TÉCNICO PROFESIONAL.

| Cultivo o Familia Botánica                | Dosis               | Época de aplicación                                                 | Vía de aplicación |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Arroz<br>( <i>Oryza Sativa</i> )          | 0.5 - 1 lt/ha       | Aplicarlo en desarrollo vegetativo                                  | Foliar            |
| Papa<br>( <i>Solanum tuberosum</i> )      | 2 a 4 lts/ha        | Aplicarlo en crecimiento vegetal, formación de estolones - engrose. | Foliar            |
| Maíz<br>( <i>Zea mays</i> )               | 2 a 4 lts/ha        | Aplicarlo en desarrollo vegetativo                                  | Foliar            |
| Rosas<br>( <i>Rosa grandiflora</i> )      | 10 - 20 cc por cama | Crecimiento vegetal prefloración<br>Etapa productiva                | Foliar            |
| Tomate<br>( <i>Solanum lycopersicum</i> ) | 1 a 2 lts/ha        | Aplicarlo en etapa de floración                                     | Foliar            |
| Melón<br>( <i>Cucumis melo</i> )          | 1 a 2 lts/ha        | Aplicarlo en etapa de floración                                     | Foliar            |
| Cacao<br>( <i>Theobroma cacao</i> )       | 1 a 2 lts/ha        | Aplicarlo en etapa productiva                                       | Foliar            |
| Banano<br>( <i>Musa x paradisiaca</i> )   | 2 a 4 lts/ha        | Aplicarlo una vez cada 15 días                                      | Foliar            |

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con las condiciones fisiológicas de la planta y condiciones de clima".